



	Pěstební cyklus v týdnech	Světlo / Den v hodinách	Aqua Vega ml A/ 10 Litřů ml B/ 10 Litřů	Aqua Flores ml A/ 10 Litřů ml B/ 10 Litřů	RHIZOTONIC ml/ 10 Litřů	CANNAZYM ml/ 10 Litřů	CANNABOOST ml/ 10 Litřů	PK 13/14 ml/ 10 Litřů	EC + v mS/cm	Celkové EC v mS/cm	
RŮST	Zasazení/ zakořeňení (3 – 5 dnů) - Před použitím pěstební médium navlhčit.	<1	18	15-25	-	40	-	-	0,7-1,1	1,1-1,5	
	Růstová fáze I - Rostliny nabývají na objemu.	0-3 ¹	18	20-30	-	20	25	-	0,9-1,3	1,3-1,7	
	Růstová fáze II - Dokončení růstu rostlin, do objevení prvních květů a plodů.	2-4 ²	12	25-35	-	20	25	20 ⁵	-	1,2-1,6	1,6-2,0
	KVĚTOVÁ FÁZE										
KVĚT	Kvěťová fáze I - Květy nebo plody se prodlužují. Růst rostliny do výšky je kompletně dokončen.	2-3	12	-	30-40	5	25	20-40	-	1,4-1,8	1,8-2,2
	Kvěťová fáze II - Květy nebo plody rostou do objemu.	1	12	-	30-40	5	25	20-40	15	1,6-2,0	2,0-2,4
	Kvěťová fáze III - Květy a plody nabývají na hmotnosti.	2-3	12	-	20-30	5	25	20-40	-	1,0-1,4	1,4-1,8
	Kvěťová fáze IV - Dozrávání květů a plodů.	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0,0	0,4

- V této fázi se podmínky liší podle druhu a počtu rostlin pěstovaných na m². Mateční rostliny zůstávají v této fázi po celou dobu své existence (6 – 12 měsíců)
- Přepnutí z 18 hodin na 12 hodin svícení je závislé na šetřovaném druhu rostliny. Obvykle se přepíná po 14 dnech růstu
- Pokud rostlina dozrává příliš rychle, uberte hodiny svícení. Hlídejte hodnotu relativní vlhkosti
- Při opakovaném používání substrátu zdvojnásobte dávku CANNAZYMU na 50 ml/10 litrů
- 20 ml/ 10 litrů je standardní dávkování. Pro maximalizaci květenství můžete zvýšit až na 40 ml/ 10 litrů

EC: EC + hodnota je měřena v mS/cm, kdy EC vody = 0,0 při teplotě 25°C, hodnota pH 6,0. Připočtete hodnotu EC naměřenou z Vámi používané vody k doporučené EC hodnotě. Celkové EC v posledním sloupci je příkladem, kde EC používané vody má hodnotu 0,4.

pH: Doporučená hodnota pH je mezi 5,2 a 6,2. Přidáním pH korektorů se hodnota EC zvyší. pH upravujeme pomocí pH min, pH plus nebo kyseliny fosforečné, citrónové, dusičné a hydroxidů draselného a volíme dle fáze, ve které se rostlina nachází.

Pěstební schéma nemusíte zcela striktně dodržovat, nicméně je dobrým pomocníkem pro začínající pěstitele, kteří si vytvářejí živný plán pro rostliny. Optimální strategie hnojení je závislá také na dalších faktorech: teplota, vlhkost vzduchu a substrátu, druh rostliny, kořenový systém rostliny, způsob zavlažování a další.



CANNNA
The solution for growth and bloom